关于头孢类/西林类抗生素高分子(有关物质)的
HPLC 分析方法开发

方法开发单位：东曹达（上海）技术服务中心

代理商：北京绿百草科技发展有限公司

联系方式：400-600-6161

传真：010-8857-9127

目录

序号	中文/英文品名	2010年CP是否已收录	聚合物分析方法有无	实验优先级	我司实验完成状况	相关色谱柱
1	盐酸头孢卡品酯 Cefcapene pivoxil hydrochloride	未收录	-	-	已完成	G2000H _{HR}
2	头孢呋辛酯 Cefuroxime 1-acetoxyethyl ester	已收录	无	-	已完成	G2000H _{HR}
3	头孢克洛 Cefaclor	已收录	无	-	已完成	G2500PW _{XL}
4	头孢丙烯 Cefprozil	已收录	无	-	已完成	G2500PW _{XL}
5	头孢克肟 Cefixime	已收录	无	-	已完成	G2000H _{HR}
6	头孢地嗪 Cefodizime	已收录	有 /G2000SW _{XL}	-	已完成	G2000SW _{XL}
7	头孢地嗪钠 Cefodizime Sodium	已收录	有 /G2000SW _{XL}	-	已完成	G2000SW _{XL}
8	头孢噻吩钠 Cefalotin Sodium	已收录	有 /GE: G-10	-	复核/ 已完成	G2000SW _{XL}
9	哌拉西林钠 Piperacillin Sodium	未收录	-	-	复核/ 已完成	G2000SW _{XL}
10	头孢泊肟酯 Cefpodoxime Proxetil	已收录	无	-	开发 /已完成	G2000H _{HR}
11	头孢米诺钠 Cefminox Sodium	未收录	-	-	已完成	G2000SW _{XL}
12	头孢匹罗 Cefpirome	未收录	-	-	客户完成	G2500PW _{XL}
13	注射用头孢他啶 Ceftazidime for Injection	已收录	有 /GE: G-10	-	已完成	G2000SW _{XL}
14	注射用头孢唑林钠 Cefazolin Sodium for Injection	已收录	有 /GE: G-10	-	已完成	G2000SW _{XL}
15	注射用头孢哌酮钠 Cefoperazone Sodium for Injection	已收录	有 /GE: G-10	-	已完成	G2000SW _{XL}

序号	中文/英文品名	2010年CP是否已收录	聚合物分析方法有无	实验优先级	我司实验完成状况	相关色谱柱
16	头孢拉定胶囊 Cefradine Capsules	已收录	有 /GE: G-10	-	已完成	G2000SW _{XL}
17	头孢硫脒 Cefathiamidine	已收录	无	-	已完成	G2500PW _{XL}
18	头孢地尼 Cefdinir	未收录	-	-	已完成	G2000SW _{XL}
19	注射用头孢美唑钠 Cefmetazole Sodium for Injection	未收录	-	-	已完成	G2000SW _{XL}
20	注射用头孢曲松钠 Ceftriaxone Sodium for Injection	已收录	有 /GE: G-10	-	已完成	G2000SW _{XL}
21	注射用盐酸头孢吡肟 Cefepime Dihydrochloride for Injection	已收录	无	-	已完成	G2000SW _{XL}
22	注射用盐酸头孢替安 Cefotian Hydrochloride for Injection	未收录	-	-	已完成	G2000SW _{XL}
23	阿莫西林胶囊 Amoxicillin Capsules	已收录	有 /GE: G-10	-	已完成	G2000SW _{XL}
24	头孢特仑新戊酯 cefterampivoxil	未收录	无	-	已完成	G2500HHR
25	头孢拉宗钠	未收录	无		已完成	G2000SW _{XL}
26	氯苄西林钠	未收录	无		已完成	G2000SW _{XL}
27	头孢替坦	未收录	无		已完成	G2000SW _{XL}

一、盐酸头孢卡品酯

1、基本信息

1) 英文名: Cefcapene pivoxil hydrochloride

2) 产品名称: 盐酸头孢卡品酯; 7-[2-(2-氨基-1,3-噻唑-4-基)戊-3-烯酰胺基]-3-(氨基甲酰氧甲基)-8-氧代-5-硫-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-甲酸 2,2-二甲基丙酰氧甲基酯盐酸盐

3) 分子结构:

4) 分子式: C₂₃H₂₉N₅O₈S₂.HCl.H₂O

5) 分子量: 622.11

6) CAS 登录号: 147816-24-8

7) 样品性质: 油溶性

2、实验情况

头孢系列的抗生素头孢卡品的 HPLC 分析方法已经被日本药典第十五改正版定制为质量控制方法。本方法利用了苯乙烯-二乙烯苯共聚物(styrene-divinylbenzene copolymer)色谱柱, 根据分子尺寸排阻色谱的原理, 进行高分子杂质的含量分析。对此我们采用一款符合本方法的 TSKgel G2000H_{HR} 色谱柱来分析头孢卡品, 其结果头孢卡品与它的高分子杂质分离效果良好, 可进行纯度确认。TSKgel G2000H_{HR} 色谱柱的溶剂交换性非常出色, 本方法中的 DMF 溶剂也可稳定使用, 是一款日本药典里记载的头孢卡品纯度检测方法适合的色谱柱。

【色谱条件】

色谱柱: TSKgel G2000H_{HR} (7.8mm I.D.*30cm)

柱温: 室温 (约 25°C)

流动相: DMF + 30mM LiBr

流速: 0.33mL/min (头孢卡品的调整保留时间约 22 分钟)

样品浓度: 2.0 mg/mL (头孢卡品)

检测器: UV (280nm)

色谱图:

二、头孢呋辛酯

1、基本信息

1) 英文名: Cefuroxime 1-acetoxyethyl ester

2) 产品名称: 头孢呋辛酯; (6R,7R)-7-[2-呋喃基(甲氧亚氨基)乙酰氨基]-3-氨基甲酰氧甲基-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-羧酸-1-乙酰氧基乙酯

3) 分子结构:

4) 分子式: $C_{20}H_{22}N_4O_{10}S$

5) 分子量: 510.47

6) CAS 登录号: 64544-07-6

7) 样品性质: 油溶性

2、实验情况

【色谱条件】

色谱柱: TSKgel G2000H_{HR} (7.8mm I.D.*30cm)

柱温: 室温 (约 25°C)

流动相: DMF + 30mM LiBr

样品浓度: 0.2mg/mL

流速: 0.33mL/min (头孢呋辛酯的调整保留时间约 22 分钟)

检测器: UV (280nm)

色谱图:

[mV]

三、头孢克洛

1、基本信息

1) 英文名: Cefaclor

2) 产品名称: 头孢克洛; 头孢氯氨苄; (6R,7R)-7-[(R)-2-氨基-2-苯乙酰氨基]-3-氯-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-甲酸

3) 分子结构:

4) 分子式: $C_{15}H_{14}ClN_3O_4S$

5) 分子量: 367.81

6) CAS 登录号: 53994-73-3

7) 样品性质: 水溶性

2、实验情况

【色谱条件】

色谱柱: TSKgel G2500PW_{XL} (7.8mm I.D.×30cm)

洗脱条件: 0.1 M P.B.

流速: 0.8 mL/min

样品浓度: 4.0 mg/mL (头孢克洛)

进样量: 20 μ L

柱温: 室温

检测条件: UV (254 nm)

色谱图:

四、头孢丙烯

1、基本信息

1) 英文名: Cefprozil

2) 产品名称: 头孢丙烯; (6R,7R)-7-[(2R)-2-氨基-2-(4-羟基苯基)乙酰氨基]-8-氧代-3-(1-丙烯基)-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-羧酸

3) 分子结构:

4) 分子式: $C_{18}H_{19}N_3O_5S$

5) 分子量: 389.43

6) CAS 登录号: 92665-29-7

7) 样品性质: 水溶性

2、实验情况

【色谱条件】

色谱柱: TSKgel G2500PW_{XL} (7.8mm I.D.×30cm)

洗脱条件: 0.1 M P.B.

流速: 0.8 mL/min

样品浓度: 4.7 mg/mL (头孢丙烯)

进样量: 20 μ L

柱温: 室温

检测条件: UV (254 nm)

色谱图:

五、头孢克肟

1、基本信息

1) 英文名: Cefixime

2) 产品名称: 头孢克肟; 7-[(Z)-2-(2-氨基-4-噻唑基)-2-(羧甲氧亚胺基)乙酰氨基]-8-氧代-3-乙烯-5-硫杂-1-氮杂二环[4,2,0]-辛-2-烯-2-羧酸

3) 分子结构:

4) 分子式: $C_{16}H_{15}N_5O_7S_2$

5) 分子量: 453.45

6) CAS 登录号: 79350-37-1

7) 样品性质: 油溶性

2、实验情况

【色谱条件】

色谱柱: TSKgel G2000H_{HR} (7.8mm I.D.x30cm)

洗脱液: DMF+30 mM LiBr+10mM H₃PO₄

流速: 0.33 mL/min

样品浓度: 2 mg/mL

进样量: 5 μ L (头孢克肟干粉)

温度: 室温

检测条件: UV (280 nm)

色谱图:

六、头孢地嗪

1、基本信息

1) 英文名: Cefodizime

2) 产品名称: 头孢地嗪; (6R,7R)-7-[(2-氨基-4-噻唑基)-(甲氧亚氨基)乙酰氨基]-3-[[[(5-羧甲基-4-甲基-2-噻唑基)硫]甲基]-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-甲酸

3) 分子结构:

4) 分子式: $C_{20}H_{20}N_6O_7S_4$

5) 分子量: 584.66

6) CAS 登录号: 69739-16-8

7) 样品性质: 水溶性

2、实验情况

【色谱条件】

色谱柱: TSKgel G2000SW_{XL} (7.8mm I.D.×30cm)

洗脱条件: 磷酸盐缓冲液 (pH7.0) [0.005 mol/L 磷酸氢二钠溶液-0.005 mol/L 磷酸二氢钠溶液 (61:39)]:

乙腈=95: 5

流速: 0.8 mL/min

样品浓度: 0.5 mg/mL (头孢地嗪)

进样量: 20 μ L

柱温: 25 C

检测条件: UV (231 nm)

色谱图：

备注：2010年版药典中头孢地嗪相关方法：

有关物质 II 照分子排阻色谱法（附录 VH）测定。

色谱条件与系统适用性试验 用适合分离分子量为 1000—10000 球状蛋白的色谱用亲水硅胶为填充剂；以磷酸盐缓冲液（pH7.0）[0.005 mol/L 磷酸氢二钠溶液—0.005 mol/L 磷酸二氢钠溶液（61:39）]—乙腈（95:5）为流动相，流速为 0.8ml/min，柱温为 25℃，检测波长为 231nm。供试品溶液的色谱图中，紧邻头孢地嗪峰前的杂质峰与头孢地嗪峰之间的分离度应符合要求。

测定法 取本品适量，精密称定，加水溶解并稀释制成每 1ml 中含头孢地嗪 0.5mg 的溶液，作为供试品溶液（临用新制）；另取头孢地嗪对照品适量，精密称定，加水溶解并稀释制成每 1ml 中约含 5μg 的溶液，作为对照品溶液。取对照品溶液 20μl 注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的 20%~25%，精密量取供试品溶液与对照品溶液各 20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算保留时间小于头孢地嗪的杂质总量，以头孢地嗪计，不得过 2.0%。

七、头孢地嗪钠

1、基本信息

1) 英文名: Cefodizime Sodium

2) 产品名称: 头孢地嗪钠; (6R,7R) -7-[(Z) -2-(2-氨基噻唑-4-基)-2-(甲氧亚氨基)乙酰胺基]-3-[(5-羧甲基-4-甲基噻唑-2-基)-硫甲基]-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-甲酸二钠盐。按无水和无乙醇物计算, 含 $C_{20}H_{20}N_6O_7S_4$ 不得少于 88.0%。

3) 分子结构:

4) 分子式: $C_{20}H_{18}N_6Na_2O_7S_4$

5) 分子量: 628.63

6) CAS 登录号: 86329-79-5

7) 样品性质: 水溶性

2、实验情况

【色谱条件】

色谱柱: TSKgel G2000SW_{XL} (7.8mm I.D.×30cm)

洗脱条件: 磷酸盐缓冲液 (pH7.0) [0.005 mol/L 磷酸氢二钠溶液-0.005 mol/L 磷酸二氢钠溶液 (61:39)]:

乙腈=95: 5

流速: 0.8 mL/min

样品浓度: 0.5 mg/mL (头孢地嗪钠)

进样量: 20 μ L

柱温: 25 C

检测条件: UV (231 nm)

色谱图：

备注：2010年版药典中头孢地嗪相关方法：

有关物质 II 照分子排阻色谱法（附录 VH）测定。

色谱条件与系统适用性试验 用适合分离分子量为 1000—10000 球状蛋白的色谱用亲水硅胶为填充剂；以磷酸盐缓冲液（pH7.0）[0.005 mol/L 磷酸氢二钠溶液—0.005 mol/L 磷酸二氢钠溶液（61:39）]—乙腈（95:5）为流动相，流速为 0.8ml/min，柱温为 25℃，检测波长为 231nm。供试品溶液的色谱图中，紧邻头孢地嗪峰前的杂质峰与头孢地嗪峰之间的分离度应符合要求。

测定法 取本品适量，精密称定，加水溶解并稀释制成每 1ml 中含头孢地嗪 0.5mg 的溶液，作为供试品溶液（临用新制）；另取头孢地嗪对照品适量，精密称定，加水溶解并稀释制成每 1ml 中约含 5μg 的溶液，作为对照品溶液。取对照品溶液 20μl 注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的 20%~25%，精密量取供试品溶液与对照品溶液各 20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算保留时间小于头孢地嗪的杂质总量，以头孢地嗪计，不得过 2.0%。

八、头孢噻吩钠

1、基本信息

1) 英文名: Cephalothin sodium

2) 产品名称: 头孢噻吩钠; (6R,7R)-3-[(乙酰氧基) 甲基]-7-[2-(2-噻吩基) 乙酰氨基]-8-氧代-5- 硫杂-1- 氮杂双环[4.2.0] 辛-2-烯-2-甲酸钠盐。按无水物计算, 含头孢噻吩 (C₁₆H₁₆N₂O₆S₂) 不得少于 90.0%。

3) 分子结构:

4) 分子式: C₁₆H₁₅N₂NaO₆S₂

5) 分子量: 418.41

6) CAS 登录号: 58-71-9

7) 样品性质: 水溶性

2、实验情况

【色谱条件】

色谱柱: TSKgel G2000SW_{XL} (7.8mm I.D.×30cm)

洗脱条件: 磷酸盐缓冲液 (pH7.0) [0.002 mol/L 磷酸氢二钠溶液-0.002 mol/L 磷酸二氢钠溶液 (61:39)]:

乙腈=95: 5

流速: 0.6 mL/min

样品浓度: 0.5 mg/mL (头孢噻吩钠)

进样量: 20μL

柱温: 25 C

检测条件: UV (235 nm)

色谱图：

备注：北京药检所讨论中头孢噻吩钠的相关方法：

头孢噻吩高分子杂质 照分子排阻色谱法（中国药典 2005 版二部附录 VH）测定。

色谱条件与系统适用性试验 用亲水硅胶高效体积排阻色谱柱（TSK-GEL G2000SWXL；7.8mm*30cm*5um）；以 pH7.0 的 0.002mol/L 磷酸盐缓冲液[0.002 mol/L 磷酸氢二钠溶液—0.002 mol/L 磷酸二氢钠溶液（61:39）—乙腈（95:5）为流动相，流速为 0.6ml/min，柱温为 25℃，检测波长为 235nm。供试品溶液的色谱图中，头孢噻吩峰与相邻的高分子杂质峰之间的分离度应大于 2。

测定法 取本品适量，精密称定，加水溶解并稀释制成每 1ml 中含头孢噻吩 0.5mg 的溶液，作为供试品溶液；另取头孢噻吩对照品适量，精密称定，加水溶解并稀释制成每 1ml 中约含 5μg 的溶液，作为对照品溶液。取对照品溶液 20μl 注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的 20%~25%，立即精密量取供试品溶液与对照品溶液各 20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算头孢噻吩高分子杂质的总量，以头孢噻吩计，不得过 2.0%。

九、哌拉西林钠

1、基本信息

1) 英文名: Piperacillin sodium

2) 产品名称: 哌拉西林钠; (2S,5R,6R)-3,3-二甲基-6-[(4-乙基-2,3-二氧代-1-哌嗪甲酰氨基)苯乙酰氨基]-7-氧代-4-硫杂-1-氮杂双环[3.2.0]庚烷-2-甲酸钠盐

3) 分子结构:

4) 分子式: $C_{23}H_{26}N_5NaO_7S$

5) 分子量: 539.54

6) CAS 登录号: 59703-84-3

7) 样品性质: 水溶性

2、实验情况

【色谱条件】

色谱柱: TSKgel G2000SW_{XL} (7.8mm I.D.×30cm)

洗脱条件: 0.01 mol/L 醋酸铵 (用稀氨溶液调节 pH 值至 7.0): 乙腈=90: 10

流速: 0.6 mL/min

样品浓度: 1.0 mg/mL (哌拉西林钠)

进样量: 20 μ L

柱温:

检测条件: UV (254 nm)

色谱图：

备注：北京药检所讨论中头孢噻吩钠的相关方法：

哌拉西林高分子杂质 照分子排阻色谱法（中国药典 2005 版二部附录 VH）测定。

色谱条件与系统适用性试验 用亲水硅胶高效体积排阻色谱柱（TSK-GEL G2000SWXL；7.8mm*30cm*5um）；以 0.01 mol/L 醋酸铵（用稀氨溶液调节 pH 值至 7.0）-乙腈（90：10）为流动相；流速为 0.6ml/min，检测波长为 254nm。供试品溶液的色谱图中，哌来西林峰与相邻的高分子杂质峰之间的分离度应大于 2。

测定法 取本品适量，精密称定，加水溶解并稀释制成每 1ml 中约含哌拉西林 1mg 的溶液，作为供试品溶液；另取哌拉西林对照品适量，精密称定，加甲醇适量溶解，加水稀释制成每 1ml 中约含 10μg 的溶液，作为对照品溶液。取对照品溶液 20μl 注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的 20%~25%，立即精密量取供试品溶液与对照品溶液各 20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算，哌拉西林高分子杂质以哌拉西林计的总量。

十、头孢泊肟酯

1、基本信息

1) 英文名: Cefpodoxime proxetil

2) 产品名称: 头孢泊肟酯; (6R,7R)-7-[2-(2-氨基噻唑-4-基)-2-(Z)-(甲氧亚氨基)-乙酰胺基]-3-甲氧甲基-8-氧代-5-硫-1-氮杂双环-[4,2,0]辛-2-烯-2-甲酸异丙氧羰氧乙基酯

3) 分子结构:

4) 分子式: $C_{21}H_{27}N_5O_9S_2$

5) 分子量: 557.59

6) CAS 登录号: 87239-81-4

7) 样品性质: 脂溶性

2、实验情况

【色谱条件】

色谱柱: TSKgel G2000H_{HR} (7.8mm I.D.*30cm)

柱温: 室温 (约 25°C)

流动相: DMF + 30mM LiBr

流速: 0.33mL/min (头孢泊肟酯的调整保留时间约 22 分钟)

样品浓度: 0.2 mg/mL (头孢泊肟酯)

进样量: 10 μ L

检测器: UV (280nm)

色谱图:

备注:

本方法参考日本药典第十五改正版头孢卡品抗生素的 HPLC 分析方法制定。本方法利用了苯乙烯-二乙烯苯共聚物(styrene-divinylbenzene copolymer)色谱柱, 根据分子尺寸排阻色谱的原理, 进行高分子杂质的含量分析。对此我们采用一款符合本方法的 TSKgel G2000HHR 色谱柱来分析头孢泊肟酯, 其结果头孢泊肟酯与它的高分子杂质分离效果良好, 可进行纯度确认。TSKgel G2000HHR 色谱柱的溶剂交换性非常出色, 本方法中的 DMF 溶剂也可稳定使用, 是一款适合头孢泊肟酯纯度检测用的色谱柱。

十一、头孢米诺钠

1、基本信息

1) 英文名: Cefminox Sodium

2) 产品名称: 头孢米诺钠; : (6R, 7S)-7β-[(S)-2-[(2-氨基-2-羧乙基)硫]乙酰氨基]-7α-甲氧基-3-[(1-甲基-1H-四唑-5-基)硫]甲基]-8-氧-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-甲酸钠盐

3) 分子结构:

4) 分子式: $C_{16}H_{20}N_7NaO_7S_3$

5) 分子量: 541.56

6) CAS 登录号: 75498-96-3

7) 样品性质: 水溶性

2、实验情况

【色谱条件】

色谱柱: TSKgel G2000SW_{XL} (7.8mm I.D.*30cm) ×2 根

柱温: 室温 (约 25°C)

流动相: 50mM PB+0.3M NaCl (pH 7.0)

流速: 0.5 mL/min (头孢米诺钠的调整保留时间约43分钟)

样品浓度: 0.14 mg/mL (头孢米诺钠)

进样量: 20μL

检测器: UV (254nm)

色谱图:

十二、头孢匹罗

1、基本信息

1) 英文名: Cefpirome

十三、注射用头孢他啶

1、基本信息

1) 英文名: Ceftazidime

2) 产品名称: 头孢他啶; (6R,7R)-7-[[[(2-氨基-4-噻唑基)-[(1-羧基-1-甲基乙氧基)亚氨基]乙酰基]氨基]-2-羧基-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-3-甲基吡啶鎓内盐

3) 分子结构:

4) 分子式: $C_{22}H_{22}N_6O_7S_2$

5) 分子量: 546.58

6) CAS 登录号: 72558-82-8

7) 样品性质: 水溶性

2、实验情况

【色谱条件】

色谱柱: TSKgel G2000SW_{XL} (7.8mm I.D.×30cm)

洗脱条件: 磷酸盐缓冲液 (pH7.0) [0.005 mol/L 磷酸氢二钠溶液-0.005 mol/L 磷酸二氢钠溶液 (61:39)]:

乙腈=95: 5

流速: 0.8 mL/min

样品浓度: 0.5 mg/mL (头孢他啶)

进样量: 20 μ L

柱温: 25 C

检测条件: UV (231 nm)

色谱图

...

Result (UV)

Peak no.	Retention time [min]	Height [mV]	Area [mV*sec]	Area% [%]	Half bandwidth [sec]	Theoretical Plates	Asymmetry factor	Resolution factor
1	7.478	0.221	1.886	0.025	8.447	15,631		
2	7.788	1.529	22.364	0.296	14.749	5,561		0.94
3	8.257	18.567	189.068	2.503	8.681	18,043	1.46	1.41
4	9.052	2.777	41.894	0.555	10.988	13,533	2.26	2.86
5	9.918	0.188	1.995	0.026	10.923	16,445		2.80
6	10.607	609.388	7297.142	96.595	10.781	19,304	1.61	2.24
		632.670	7554.349	100.000				

药典方法计算的分离度:

$$R=0.188/0.06=3.13$$

十四、注射用头孢唑林钠

1、基本信息

1) 英文名: **Cefazolin sodium salt**

2) 产品名称: 头孢唑林钠;唑啉头孢菌素钠;(6R,7R)-3-[[[(5-甲基-1,3,4-噻二唑-2-基)硫]甲基]-7-[(1H-四唑-1-基)乙酰氨基]-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-甲酸钠盐;头孢唑啉钠;头孢唑啉钠盐

3) 分子结构:

4) 分子式: $C_{14}H_{13}N_8NaO_4S_3$

5) 分子量: 476.49

6) CAS 登录号: 27164-46-1

7) 样品性质: 水溶性

2、实验情况

【色谱条件】

色谱柱: TSKgel G2000SW_{XL} (7.8mm I.D.×30cm)

洗脱条件: 磷酸盐缓冲液 (pH7.0) [0.005 mol/L 磷酸氢二钠溶液-0.005 mol/L 磷酸二氢钠溶液 (61:39)]:

乙腈=95: 5

流速: 0.8 mL/min

样品浓度: 0.5 mg/mL (头孢唑林钠)

进样量: 20 μ L

柱温: 25 C

检测条件: UV (231 nm)

色谱图

Result (UV)

Peak no.	Retention time [min]	Height [mV]	Area [mV*sec]	Area% [%]	Half bandwidth [sec]	Theoretical Plates	Asymmetry factor	Resolution factor
1	7.528	0.082	0.771	0.013	9.742	11,909		
2	7.795	0.293	2.947	0.050	9.624	13,082		0.97
3	8.280	0.801	10.126	0.172	11.691	10,004	1.96	1.61
4	9.053	4.341	82.421	1.401	16.730	5,840	3.43	1.92
5	10.852	426.300	5633.241	95.774	12.037	16,208	2.04	4.42
6	11.492	11.675	152.316	2.590	11.553	19,733		1.92
		443.492	5881.821	100.000				

十五、注射用头孢哌酮钠

1、基本信息

1) 英文名: Cefoperazone Sodium for Injection

2) 产品名称: 头孢哌酮钠; 7-[[[(4-乙基-2,3-二氧代-1-哌嗪基)甲酰氨基](4-羟基苯基)乙酰氨基]-3-[(1-甲基-1H-四唑-5-基)硫甲基]-8-氧代-5-硫-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-甲酸钠盐

3) 分子结构:

4) 分子式: $C_{25}H_{26}N_9NaO_8S_2$

5) 分子量: 667.65

6) CAS 登录号: 62893-20-3

7) 样品性质: 水溶性

2、实验情况

【色谱条件】

色谱柱: TSKgel G2000SW_{XL} (7.8mm I.D.×30cm)

洗脱条件: 磷酸盐缓冲液 (pH7.0) [0.005 mol/L 磷酸氢二钠溶液-0.005 mol/L 磷酸二氢钠溶液 (61:39)]:

乙腈=95: 5

流速: 0.8 mL/min

样品浓度: 0.5 mg/mL (头孢哌酮钠)

进样量: 20 μ L

柱温: 25 C

检测条件: UV (231 nm)

色谱图

Result (UV)

Peak no.	Retention time [min]	Height [mV]	Area [mV*sec]	Area% [%]	Half bandwidth [sec]	Theoretical Plates	Asymmetry factor	Resolution factor
1	7.528	0.140	1.642	0.018	9.555	12,380		
2	7.803	0.430	4.191	0.047	8.943	15,184	1.10	1.05
3	8.262	1.646	17.976	0.202	9.788	14,208	1.46	1.73
4	9.073	12.729	163.080	1.831	10.378	15,244	2.15	2.84
5	10.777	692.339	8719.308	97.902	11.302	18,133	1.74	5.55
		707.284	8906.196	100.000				

十六、头孢拉定胶囊

1、基本信息

1) 英文名: Cefradine Capsules

2) 产品名称: 头孢拉定; (6R,7R)-7-[(R)-2-氨基-2-(1,4-环己二烯基)乙酰氨基]-3-甲基-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-甲酸

3) 分子结构:

4) 分子式: $C_{16}H_{19}N_3O_4S$

5) 分子量: 349.4

6) CAS 登录号: 38821-53-3

7) 样品性质: 水溶性

2、实验情况

【色谱条件】

色谱柱: TSKgel G2000SW_{XL} (7.8mm I.D.×30cm)

洗脱条件: 磷酸盐缓冲液 (pH7.0) [0.005 mol/L 磷酸氢二钠溶液-0.005 mol/L 磷酸二氢钠溶液 (61:39)]:

乙腈=95: 5

流速: 0.8 mL/min

样品浓度: 0.5 mg/mL (头孢哌酮钠)

进样量: 20 μ L

柱温: 25 C

检测条件: UV (231 nm)

色谱图

Result (UV)

Peak no.	Retention time [min]	Height [mV]	Area [mV*sec]	Area% [%]	Half bandwidth [sec]	Theoretical Plates	Asymmetry factor	Resolution factor
1	9.260	0.831	10.811	0.227	9.532	18,820	0.93	
2	10.878	0.585	23.224	0.487	31.430	2,389	0.91	2.79
3	12.543	3.423	61.065	1.281	16.049	12,183		2.48
4	13.198	306.192	4672.281	98.005	13.380	19,407	1.28	1.57
		311.031	4767.381	100.000				

药典方法计算的分离度:

$R=3.423/0.673=5.08$

十七、头孢硫脒

1、基本信息

1) 英文名: Cefathiamidine

2) 产品名称: 头孢硫脒: (6R, 7R)-3[(乙酰氧基) 甲基]-7-[α-(N, N'-二异丙基脒硫基)-乙酰氨基]8-氧代-5-硫杂-1-氮杂双环[4, 2, 0]辛 -2-烯-2-甲酸内铵盐

3) 分子结构:

4) 分子式: C₁₉H₂₈N₄O₆S₂

5) 分子量: 472.59

6) CAS 登录号: 33075-00-2

7) 样品性质: 水溶性

2、实验情况

【色谱条件】

色谱柱: TSKgel G2000SW_{XL} (7.8mm I.D.×30cm)

洗脱条件: 0.01mol/L 磷酸盐缓冲液(0.005mol/LNaH₂PO₄+0.005mol/LNa₂HPO₄):乙腈=9:1

流速: 0.6 mL/min

样品浓度: 1.0 mg/mL(头孢硫脒的调整保留时间约为 18 分钟)

进样量: 20μL

柱温: 25 C

检测条件: UV (254 nm)

十八、头孢地尼

1、基本信息

1) 英文名: Cefdinir

2) 产品名称: 头孢地尼; (6R,7R)-7-[(Z)-2-(2-氨基-4-噻唑基)-2-羟基亚氨基乙酰氨基]-8-氧代-3-乙烯基-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-羧酸

3) 分子结构:

4) 分子式: $C_{14}H_{13}N_5O_5S_2$

5) 分子量: 395.42

6) CAS 登录号: 91832-40-5

7) 样品性质: 水溶性

2、实验情况

【色谱条件】

色谱柱: TSKgel G2000SW_{XL} (7.8mm I.D.×30cm)

洗脱条件: 0.01mol/L 磷酸盐缓冲液(0.005mol/LNaH₂PO₄+0.005mol/LNa₂HPO₄):乙腈=95:5

流速: 0.8 mL/min

样品浓度: 0.5 mg/mL (10%甲醇溶解)

进样量: 20μL

柱温: 25 C

检测条件: UV (231 nm)

色谱图

<Chromatogram> (UV)

Result (UV)

Peak no.	Retention time [min]	Height [mV]	Area [mV*sec]	Area% [%]	Half bandwidth [sec]	Theoretical Plates	Asymmetry factor	Resolution factor
1	7.862			0.019	10.969	10,245	0.91	
2	8.338	0.162	1.898	0.137	13.615	7,480		1.37
3	9.287	0.800	13.823	0.938	17.209	5,807	1.60	2.17
4	11.085	4.544	94.583	98.907	12.810	14,933	2.05	4.23
		677.503	9977.499	100.000				

十九、注射用头孢美唑钠

1、基本信息

1) 英文名: Cefmetazole Sodium for Injection

2) 产品名称: 头孢美唑钠; (6R,7S)-7-[[2-(氰甲基硫)乙酰]氨基]-7-甲氧基-3-[(1-甲基四唑-5-基)硫甲基]-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-甲酸钠盐

3) 分子结构:

4) 分子式: $C_{15}H_{16}N_7NaO_5S_3$

5) 分子量: 493.52

6) CAS 登录号: 56796-39-5

7) 样品性质: 水溶性

2、实验情况

【色谱条件】

色谱柱: TSKgel G2000SW_{XL} (7.8mm I.D.×30cm)

洗脱条件: 0.01mol/L 磷酸盐缓冲液(0.005mol/LNaH₂PO₄+0.005mol/LNa₂HPO₄):乙腈=9:1

流速: 0.6 mL/min

样品浓度: 0.05 mg/mL

进样量: 20μL

柱温: 25 °C

检测条件: UV (254 nm)

色谱图:

二十、注射用头孢曲松钠

1、基本信息

1) 英文名: Ceftriaxone Sodium for Injection

2) 产品名称: 头孢曲松钠 [6R-[6 α ,7 β (Z)]]-3-[[[(1,2,5,6-四氢-2-甲基-5,6-二氧代-1,2,4-三嗪-3-基)硫]甲基]-7-[[[(2-氨基-4-噻唑基)(甲氧亚氨基)乙酰基]氨基]-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-羧酸钠盐

3) 分子结构:

4) 分子式: $C_{18}H_{17}N_8NaO_7S_3$

5) 分子量: 576.56

6) CAS 登录号: 104376-79-6

7) 样品性质: 水溶性

2、实验情况

【色谱条件】

色谱柱: TSKgel G2000SW_{XL} (7.8mm I.D.×30cm)

洗脱条件: 0.01mol/L 磷酸盐缓冲液(0.005mol/LNaH₂PO₄+0.005mol/LNa₂HPO₄):乙腈=9:1

流速: 0.6 mL/min

样品浓度: 0.05 mg/mL

进样量: 20 μ L

柱温: 25 °C

检测条件: UV (254 nm)

色谱图:

头孢曲松钠注射液使用 G-10 填料分离后收集组分(聚合物部分)的分析结果谱图:

结论: 将 Sephadex-G-10 纯化后的组分收集起来, 使用 TSKgel G2000SW_{XL} 分析, 2#管组分的聚合物的出峰时间与使用 TSKgel G2000SW_{XL} 分析原注射液样品的聚合物组分出峰时间基本一致的。两者对高聚物的分析结果是一致的。(详细分析结果参考附件头孢曲松钠分离分析报告)

二十一、注射用盐酸头孢吡肟

1、基本信息

1) 英文名: Cefepime Dihydrochloride for Injection

2) 产品名称: 盐酸头孢吡肟 1-[[[(6R, 7R)-7-[2-(2-氨基-4-噻唑基)-乙醛酰氨基]-2-羧基-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-3-基]甲基]-1-甲基吡咯烷氯化物. 7²- (Z) -(O-甲基肟), 盐酸一水化合物

3) 分子结构:

4) 分子式: $C_{19}H_{25}ClN_6O_5S_2 \cdot HCl \cdot H_2O$

5) 分子量: 571.5

6) CAS 登录号: 123171-59-5

7) 样品性质: 水溶性

2、实验情况

【色谱条件】

色谱柱: TSKgel G2000SW_{XL} (7.8mm I.D.×30cm)

洗脱条件: 0.01mol/L 磷酸盐缓冲液(0.005mol/LNaH₂PO₄+0.005mol/LNa₂HPO₄):乙腈=9:1

流速: 0.6 mL/min

样品浓度: 1 mg/mL

进样量: 20μL

柱温: 25 °C

检测条件: UV (254 nm)

色谱图:

二十二、注射用盐酸头孢替安

1、基本信息

1) 英文名: Cefotian Hydrochloride for Injection

2) 产品名称: 盐酸头孢替安, (6R-反式)-7-[[2-氨基-4-噻唑基]乙酰基]氨基]-3-[[[1-[(2-(二甲氨基)乙基)-1H-四唑-5-基]硫代甲基]-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-羧酸二盐酸盐

3) 分子结构:

4) 分子式: $C_{18}H_{23}N_9O_4S_3 \cdot 2HCl$

5) 分子量: 598.54

6) CAS 登录号: 66309-69-1

7) 样品性质: 水溶性

2、实验情况

【色谱条件】

色谱柱: TSKgel G2000SW_{XL} (7.8mm I.D.×30cm)

洗脱条件: 0.01mol/L 磷酸盐缓冲液(0.005mol/LNaH₂PO₄+0.005mol/LNa₂HPO₄):乙腈=9:1

流速: 0.6 mL/min

样品浓度: 1mg/mL

进样量: 20μL

柱温: 25 °C

检测条件: UV (254 nm)

色谱图:

二十三、阿莫西林胶囊

1、基本信息

1) 英文名: Amoxicillin Capsules

2) 产品名称: 阿莫西林, (2S,5R,6R)-3,3-二甲基-6-[(R)-(-)-2-氨基-2-(4-羟基苯基)乙酰氨基]-7-氧代-4-硫杂-1-氮杂双环[3.2.0]庚烷-2-甲酸三水合物

3) 分子结构:

4) 分子式: $C_{16}H_{19}N_3O_5S \cdot 3H_2O$

5) 分子量: 419.46

6) CAS 登录号: 61336-70-7

7) 样品性质: 水溶性

2、实验情况

【色谱条件】

色谱柱: [TSKgel G2000SW_{XL}](#) (7.8mm I.D.×30cm)

洗脱条件: 0.01mol/L 磷酸盐缓冲液(0.005mol/LNaH₂PO₄+0.005mol/LNa₂HPO₄):乙腈=9:1

流速: 0.6 mL/min

样品浓度: 1mg/mL

进样量: 20μL

柱温: 25 °C

检测条件: UV (254 nm)

色谱图:

二十四、头孢特仑新戊酯

1、基本信息

1) 英文名: cefterampivoxil

2) 产品名称: 头孢特仑新戊酯: 6R, 7R)-7-[(Z)-2-(2-氨基-4-噻唑基)-2-(甲氧亚氨基)乙酰氨基]-3-[2-(5-甲基-2H-四唑-2-基)甲基]-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂双环[4,2,0]辛-2-烯-2-羧酸新戊酰氧甲酯

3) 分子结构:

4) 分子式: $C_{22}H_{27}N_9O_7S_2$

5) 分子量: 593.64

6) CAS 登录号: 82547-58-8

7) 样品性质: 油溶性

2、实验情况

【色谱条件】

色谱柱: [TSKgel G2500HHR](#) (7.8mm I.D.×30cm)

洗脱条件: DMF+ 30mM LiBr

流速: 0.33 mL/min

样品浓度: 1.0 mg/mL(头孢特仑新戊酯的调整保留时间约为 25.5 分钟)

进样量: 20 μ L

柱温: 25 $^{\circ}$ C

检测条件: UV (263 nm)

色谱图:

二十五、头孢拉宗钠

1、基本信息

1) 英文名: CefbuperazoneSodium

2) 产品名称: (6R,7S)-7-[[[(2R,3S)-2-[(4-乙基-2,3-二氧代哌嗪-1-甲酰)氨基]-3-羟基丁酰]氨基]-7-甲氧基-3-[(1-甲基四唑-5-基)硫甲基]-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-甲酸钠

3) 分子结构:

4) 分子式: $C_{22}H_{28}N_9NaO_9S_2$

5) 分子量: 649.634

6) CAS 登录号: 76648-01-6

7) 样品性质: 水溶性

2、实验情况

【色谱条件】

色谱柱: TSKgel G2000SWXL (7.8mm I.D.x30cm)

洗脱条件: 10mMPB(5mMNa₂HPO₄+5mMNa₂HPO₄): ACN=95:5

流速: 0.6 mL/min

样品浓度: 1.0 mg/mL(头孢拉宗钠的调整保留时间约为 15.8 分钟)

进样量: 10 μ L

柱温: 25 $^{\circ}$ C

检测条件: UV (267 nm)

二十六、氨苄西林钠

1、基本信息

- 1) 英文名: Ampicillin
- 2) 产品名称: (2S,5R,6R)-3,3- 二甲基 -6- [(R)-2-氨基-2- 苯乙酰氨基] -7- 氧代-4- 硫杂 -1-氮杂双环 [3.2.0] 庚烷-2- 甲酸钠
- 3) 分子结构:

- 4) 分子式: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
- 5) 分子量: 371.39
- 6) CAS 登录号: 69-52-3
- 7) 样品性质: 水溶性

2、实验情况

【色谱条件】

- 色谱柱: TSKgel G2000SWXL (7.8mm I.D.x30cm)
洗脱条件: 10mMPB(5mMNa₂HPO₄+5mMNa₂HPO₄): ACN=90:10
流速: 0.6 mL/min
样品浓度: 1.0 mg/mL(氨苄西林钠的调整保留时间约为 16.8 分钟)
进样量: 20μL
柱温: 25 °C
检测条件: UV (254 nm)

二十七、头孢替坦

1、基本信息

1) 英文名: Cefotetan

2) 产品名称: (6R,7S)-7-[[4-(1-氨基-3-羟基-1,3-二氧代丙烷-2-基亚基)1,3-二硫杂环丁烷-2-甲酰]氨基]-7-甲氧基-3-[(1-甲基四唑-5-基)硫甲基]-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-甲酸

3) 分子结构:

4) 分子式: C₁₇H₁₇N₇O₈S₄

5) 分子量: 575.619

6) CAS 登录号: 69712-56-7

7) 样品性质: 水溶性

2、实验情况

【色谱条件】

色谱柱: TSKgel G2000SWXL (7.8mm I.D.x30cm)

洗脱条件: 10mMPB(5mMNa₂HPO₄+5mMNa₂HPO₄): ACN=95:5

流速: 0.5 mL/min

样品浓度: 0.15 mg/mL(头孢替坦的调整保留时间约为 17 分钟)

进样量: 20μL

柱温: 25 °C

检测条件: UV (254 nm)